

로스앤젤레스 카운티



라틴계 여성은 COVID-19의 영향을 많이 받습니다.1



저소득층 여성은 COVID-19의 영향을 많이 받습니다.2

백신의 종류



화이자 2회접종 21일 간격

모더나 2회접종 28일 간격

존슨 & 존슨* 1회 접종

FDA는 안정성과 효용성이 증명된 3 가지 COVID-19 백신의 사용을 승인 했습니다.8

COVID-19 유발 바이러스가 함유된 백신은 없습니다. 백신 접종으로 COVID-19에 걸릴 수는 없습니다.6

3가지 백신 모두의 이점이 위험보다 훨씬 큽니다. *CDC의 J&J 백신 정보 자료를 참조하십시오.

여성은 직업이나 가정 내의 역할로 인해 COVID-19에 노출될 위험이 높습니다.



미국에서는 아프리카계 미국인 어머 니의 67.5%와 라틴계 어머니의 41.4%가 가족의 생계를 혼자 책임지고 있습니다. 3

재택 근무가 불가능한 직종에 종사하는 여성이 많습니다.⁴



74%

접촉이 많은 직종(예: 숙박업, 음식 서비스, 개인 관리 서비스)에 종사하는 사람의 74%가 여성입니다.5

미국에서 의료 종사자의 76%가 여성입니다.6





미국에서 간병인 3명 중의 2 명이 여성입니다.⁷

임신 및 수유

COVID-19에 걸린 임산 부는 중증 질환 및 조산 을 포함한 임신 합병증으 로 발전할 위험이 더 높 습니다.8

COVID-19 백신이 출 산율을 감소 시킨다는 소문은 증거가 없으며 이미 전국적으로 7,500만 명 이상의 여 성이 예방 접종을 받았 습니다.9

CDC. 미국 산부인과 협회. 산모-태아 의학 협회는 모 두 백신 접종 자격이있는 임산부 및 모유 수유자에게 COVID-19 백신을 제공해야 한다는 데 동의합니다.

임산부와 모유 수유자는 COVID-19 백신을 접종할 지 개별적으로 결정할 수 있습니다.

자료에 의하면 산모와 아이 모두에게 어떠한 문제나 합병증이 없습니다. 백신을 접종하는 임산부가 많아지면서 백신의 안전성을 증명하는 자료도 많아집니다.8

임산부를 대상으로 한 COVID-19 백신에 대한 임상 시험이 진행 중 입니다. 더 많은 정보는 향후 제공 될 예정입니다.11

적절한 위생을 지키면, 모유 수유를 통해 COVID-19이 전염된다 는 증거는 없습니다. 9



[2]Clark et al. (2020) PLOS Neglected Tropical Diseases.14:7. [3]Center for American Progress: On the Frontlines at Work and at Home [4] Alon et al, (2020) National Bureau of Economic Research

[6]U.S. Census Bureau; Women in Healthcare

[7]CDC; Women, Caregiving, and COVID-19 [8]CDC; COVID-19 Vaccine Safety & Monitoring

[9]CDC; COVID-19 Myths & Facts

[5] Econofact: Impact of COVID-19 Crisis on Women's Employment [10] Harvard Health Publishing: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding [11]CDC: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding [12]American College of Obstetricians and Gynecologists: COVID-19, Pregnancy and

Breastfeeding [13] Society for Maternal-Fetal Medicine: COVID-19 Vaccines and Pregnancy