


女性與COVID-19疫苗



在洛杉磯縣



拉丁裔女性受到 COVID-19 的影響特別大。¹



低收入女性受到 COVID-19 的影響也特別大。²

由於其工作責任和家庭角色，女性面臨著感染 COVID-19 的高風險



在美國，67.5% 的非洲裔母親和 41.4% 的拉丁裔母親是家庭中的唯一經濟支柱。³

對於無法遠程參與的工作崗位，女性佔據了更高的比例。⁴



疫苗的類型



輝瑞疫苗

需接種 2 劑
中間需間隔 21 天

FDA 已批准使用三種不同的 COVID-19 疫苗，這些疫苗均已被證明是安全且有效的。⁸

莫德納疫苗

需接種 2 劑
中間需間隔 28 天


這些疫苗中沒有一種含有導致患上 COVID-19 的病毒。你不會因接種疫苗而感染 COVID-19。⁹

強生疫苗*

需接種 1 劑

所有這 3 種疫苗的好處遠遠大於其風險。

*請參閱 [CDC 強生疫苗信息表](#)



高接觸性工作（如接待服務、餐飲服務、個人服務）的群體中，有 74% 的從業者是女性。⁵

在美國，有 76% 的醫護人員是女性。⁶



在美國，每 3 名護理人員中就有 2 名是女性。⁷

懷孕與哺乳期婦女

感染 COVID-19 的孕婦患更嚴重疾病和早產等妊娠併發症的風險更高。⁸

美國疾控中心（CDC）、美國婦產科醫師學會和母胎醫學學會一致認為，應向符合接種 COVID-19 疫苗條件的懷孕和哺乳婦女提供 COVID-19 疫苗。^{10, 11, 12, 13}

在保持適當的衛生條件情況下，沒有證據表明 COVID-19 會透過母乳餵養傳播。⁹

沒有證據表明接種 COVID-19 疫苗會降低生育率，全美國已有超過 7500 萬名女性接種了 COVID-19 疫苗。⁹

孕婦和哺乳期婦女可以自行決定是否接種 COVID-19 疫苗。^{10, 11}

沒有任何資料顯示母親或嬰兒會出現任何問題或併發症。隨著越來越多的孕婦接種疫苗，有關疫苗安全性的證據也越來越多。⁸

目前，正在對孕婦進行 COVID-19 疫苗的臨床試驗；之後，將向公眾提供更多資訊。¹¹



[1] LACDPH: COVID-19 Locations & Demographics

[2] Clark et al. (2020). PLOS Neglected Tropical Diseases. 14:7.

[3] Center for American Progress: On the Frontlines at Work and at Home

[4] Alon et al. (2020). National Bureau of Economic Research

[5] Econofact: Impact of COVID-19 Crisis on Women's Employment

[6] U.S. Census Bureau: Women in Healthcare

[7] CDC: Women, Caregiving, and COVID-19

[8] CDC: COVID-19 Vaccine Safety & Monitoring

[9] CDC: COVID-19 Myths & Facts

[10] Harvard Health Publishing: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[11] CDC: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[12] American College of Obstetricians and Gynecologists: COVID-19, Pregnancy and Breastfeeding

[13] Society for Maternal-Fetal Medicine: COVID-19 Vaccines and Pregnancy