


ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ COVID-19-Ի ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԸ



ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ



COVID-19-ը անհամաչափորեն է ազդում Լատինամերիկացի կանանց վրա: ¹



COVID-19-ը անհամաչափորեն է ազդում ցածր եկամուտ ունեցող կանանց վրա: ²

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ



PFIZER

2 ԴԵՂԱՉԱՓ

2 1 ՕՐ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԿ

FDA-ն թույլատրել է COVID-19-ի դեմ երեք տարբեր պատվաստանյութերի օգտագործումը, որոնք դրսևորել են իրենց անվտանգ և արդյունավետ լինելը:⁸

MODERNA

2 ԴԵՂԱՉԱՓ

2 8 ՕՐ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԿ

Այդ պատվաստանյութերից որևէ մեկը չի պարունակում COVID-19-ը առաջացնող վիրուսը: Դուք չեք կարող վարակվել COVID-19-ով պատվաստանյութից:⁹

JOHNSON & JOHNSON*

1 ԴԵՂԱՉԱՓ

Բոլոր 3 պատվաստանյութերի օգուտներն ավելի շատ են, քան վտանգները:


*Տե՛ս [CDC J&J Պատվաստանյութի Տեղեկատվական Թերթիկը](#):

ԿԱՆԱՅՔ ԳՏԵԿՈՒՄ ԵՆ COVID-19-ՈՎ ԿԱՐԱԿԿԵԼՈՒ ԲԱՐՁՐ ԿՏԱՆԳԻ ՆԵՐՔՈՒ ԻՐԵՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ



Միացյալ Նահանգներում Աֆրոամերիկացի մայրերի 67.5% և Լատինամերիկացի մայրերի 41.4% հանդիսանում են իրենց ընտանիքների միակ աշխատողները:³

Երբ հեռավար աշխատելը հնարավոր չէ, կանայք զբաղեցնում են ավելի շատ աշխատատեղեր: ⁴



Բարձր շփում Նախատեսող աշխատանքներ (ինչպես օրինակ հյուրընկալություն, սննդի ոլորտում մատուցվող ծառայություն, անհատական ծառայություններ) իրականացնող մարդկանց 74%-ը կանայք են: ⁵

Միացյալ Նահանգներում առողջապահական ոլորտի աշխատողների 76%-ը կանայք են: ⁶



Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր 3 ինսամոլներից 2-ը կանայք են:⁷

ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

COVID-19-ով վարակվող հղի կանայք գտնվում են ծանր հիվանդանալու ավելի բարձր վտանգի և հղիության բարդացումների ներքո, ներառյալ՝ վաղաժամ ծննդաբերությունը: ⁸

Չկան ապացույցներ այն մասին, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը նվազեցնում են ծնելիությունը և ավելի քան 75 միլիոն կանայք արդեն պատվաստվել են ամբողջ երկրում:⁹

CDC-ն, Մանկաբարձների և Գինեկոլոգների Ամերիկյան Ընկերությունը և Մոր և Պտղի Բժշկության Միությունը միասին համաձայն են, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը պետք է տրամադրվեն հղի կանանց և կրծքով կերակրող մայրերին, որոնք իրավասու են պատվաստման: ^{10, 11, 12, 13}

Հղի կանայք և կրծքով կերակրող մայրերը կարող են ինքնուրույն որոշել պատվաստվել COVID-19-ի դեմ, թե ոչ:^{10, 11}

Տվյալները չեն ցուցադրել որևէ խնդիր կամ բարդություն մայրերի կամ նորածին երեխաների համար: Որքան ավելի շատ հղի կանայք են պատվաստվում, այնքան ավելանում են պատվաստանյութերի անվտանգ լինելու վերաբերյալ ապացույցը:⁸

Շարունակվում են հղի կանանց նկատմամբ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի ազդեցության կլինիկական փորձարկումները. ավելի շատ տեղեկություններ հասանելի կլինեն ապագայում: ¹¹

Պատշաճ հիգիենայի պահպանման դեպքում չկա կրծքով կերակրման միջոցով COVID-19-ի փոխանցման որևէ ապացույց: ⁹



1 LACDPH: COVID-19 Locations & Demographics
2Clark. et al. (2020). PLOS Neglected Tropical Diseases.14:7. [3]Center for American Progress: On the Frontlines at Work and at Home.[4]Alon et al. (2020). National Bureau of Economic Research

[5]Econofact: Impact of COVID-19 Crisis on Women's Employment
[6]U.S. Census Bureau: Women in Healthcare
[7]CDC: Women, Caregiving, and COVID-19
[8]CDC: COVID-19 Vaccine Safety & Monitoring
[9]CDC: COVID-19 Myths & Facts

[10]Harvard Health Publishing: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding
[11]CDC: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding
12 American College of Obstetricians and Gynecologists: COVID-19, Pregnancy and Breastfeeding
13 Society for Maternal-Fetal Medicine: COVID-19 Vaccines and Pregnancy