

ЖЕНЩИНЫ И ВАКЦИНА ОТ COVID-19



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health
May 2021 (Russian)

В ОКРУГЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС



Женщины латиноамериканского происхождения непропорциональным образом затронуты COVID-19. ¹



Малообеспеченные женщины непропорциональным образом затронуты COVID-19. ²

ЖЕНЩИНЫ НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ИЗ-ЗА СВОЕЙ РАБОТЫ И РОЛИ В СЕМЬЕ



В США 67,5% матерей-афроамериканок и 41,4% матерей-латиноамериканок — единственные кормильцы в семье. ³

Женщины занимают больше должностей, дистанционное выполнение которых невозможно. ⁴



ВИДЫ ВАКЦИН



PFIZER

2 ДОЗЫ

С РАЗНИЦЕЙ В 21 ДЕНЬ

FDA разрешило использование трех разных вакцин от COVID-19, которые доказали свою безопасность и эффективность. ⁸

MODERNA

2 ДОЗЫ

С РАЗНИЦЕЙ В 28 ДНЕЙ


Ни одна из этих вакцин не содержит вирус, вызывающий COVID-19. Заразиться COVID-19 от вакцины невозможно. ⁹

JOHNSON & JOHNSON*

1 ДОЗА

Польза от всех 3-х вакцин намного превышает риски.

*См. Информационный бюллетень CDC о вакцине J&J



74% людей, работающих в сферах, требующих частого контакта (гостиничная сфера, обслуживание питанием, услуги личного ухода) — женщины. ⁵

76% медицинских работников в США — женщины. ⁶



В США каждые 2 из 3 сиделок — женщины. ⁷

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Беременные женщины, зараженные COVID-19, находятся в группе повышенного риска развития тяжелого заболевания и возникновения осложнений с беременностью, включая преждевременные роды. ⁸

Нет никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19 снижают фертильность. Более 75 миллионов женщин по всей стране уже прошли вакцинацию. ⁹

CDC, Американский колледж акушеров и гинекологов и Медицинское общество матери и плода сходятся во мнении, что вакцины от COVID-19 должны быть предложены беременным и кормящим женщинам, имеющим право на вакцинацию. ^{10, 11, 12, 13}

Беременные и кормящие женщины могут принять собственное решение о том, хотят ли они получить вакцину от COVID-19. ^{10, 11}

Имеющиеся данные не показали никаких проблем или осложнений для мам или малышей. По мере вакцинации всё большего количества беременных женщин увеличиваются доказательства безопасности вакцин. ⁸

В настоящее время ведутся клинические испытания вакцины от COVID-19 на беременных женщинах; в будущем появится больше информации. ¹¹

При соблюдении надлежащей гигиены нет никаких доказательств передачи COVID-19 через кормление грудью. ⁹



[1] LACDPH: COVID-19 Locations & Demographics

[2] Clark et al. (2020). PLOS Neglected Tropical Diseases. 14:7.

[3] Center for American Progress: On the Frontlines at Work and at Home

[4] Alon et al. (2020). National Bureau of Economic Research

[5] Econofact: Impact of COVID-19 Crisis on Women's Employment

[6] U.S. Census Bureau: Women in Healthcare

[7] CDC: Women, Caregiving, and COVID-19

[8] CDC: COVID-19 Vaccine Safety & Monitoring

[9] CDC: COVID-19 Myths & Facts

[10] Harvard Health Publishing: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[11] CDC: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[12] American College of Obstetricians and Gynecologists: COVID-19, Pregnancy and Breastfeeding

[13] Society for Maternal-Fetal Medicine: COVID-19 Vaccines and Pregnancy