

在洛杉矶县



拉丁裔女性受到COVID-19的影响特别大。¹



低收入女性受到COVID-19的影响也特别大。²

疫苗的类型



辉瑞疫苗

需接种2剂
中间需间隔21天

FDA已批准使用三种不同的COVID-19疫苗，这些疫苗均已被证明是安全且有效的。⁸

莫德纳疫苗

需接种2剂
中间需间隔28天

这些疫苗中没有一种含有导致患上COVID-19的病毒。你不会因接种疫苗而感染COVID-19。⁸

强生疫苗*

需接种1剂


所有这3种疫苗的好处远远大于其风险。
*请参阅[CDC强生疫苗信息表](#)

由于其工作责任和家庭角色，女性面临着感染COVID-19的高风险



在美国，67.5%的非洲裔母亲和41.4%的拉丁裔母亲是家庭中的唯一经济支柱。³

对于无法远程参与的工作岗位，女性占据了更高的比例。⁴



从事高接触性工作（如接待服务、餐饮服务、个人服务）的群体中，有74%的从业者是女性。⁵

在美国，有76%的医护人员是女性。⁶



在美国，每3名护理人员中就有2名是女性。⁷

怀孕与哺乳期妇女

感染COVID-19的孕妇患更严重疾病和早产等妊娠并发症的风险更高。⁸

美国疾控中心（CDC）、美国妇产科医师学会和母胎医学学会一致认为，应向符合接种COVID-19疫苗条件的怀孕和哺乳期妇女提供COVID-19疫苗。^{10, 11, 12, 13}

没有证据表明接种COVID-19疫苗会降低生育率，全美国已有超过7500万名女性接种了COVID-19疫苗。⁹

孕妇和哺乳期妇女可以自行决定是否接种COVID-19疫苗。^{10, 11}

在保持适当的卫生条件下，没有证据表明COVID-19会通过母乳喂养传播。⁹

没有任何数据显示母亲或婴儿会出现任何问题或并发症。随着越来越多的孕妇接种疫苗，有关疫苗安全性的证据也越来越多。⁸

目前，正在对孕妇进行COVID-19疫苗的临床试验；之后，将向公众提供更多信息。¹¹



[1] LACDPH: COVID-19 Locations & Demographics

[2] Clark et al. (2020). PLOS Neglected Tropical Diseases. 14:7.

[3] Center for American Progress: On the Frontlines at Work and at Home

[4] Alon et al. (2020). National Bureau of Economic Research

[5] Econofact: Impact of COVID-19 Crisis on Women's Employment

[6] U.S. Census Bureau: Women in Healthcare

[7] CDC: Women, Caregiving, and COVID-19

[8] CDC: COVID-19 Vaccine Safety & Monitoring

[9] CDC: COVID-19 Myths & Facts

[10] Harvard Health Publishing: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[11] CDC: COVID-19 Vaccine, Pregnancy, and Breastfeeding

[12] American College of Obstetricians and Gynecologists: COVID-19, Pregnancy and Breastfeeding

[13] Society for Maternal-Fetal Medicine: COVID-19 Vaccines and Pregnancy