

Las vacunas : : : : : durante y después del embarazo

Lo que debe saber:

- **Las vacunas son seguras** durante el embarazo, tanto para las personas embarazadas como para sus bebés.
- **Mantenerse al día** con las siguientes vacunas le **brindará la mayor protección** a usted y a su recién nacido durante los primeros meses de vida hasta que el bebé pueda recibir sus propias vacunas.

Vacunas recomendadas durante el embarazo

- **Vacuna Tdap:** Se recomienda que reciba la vacuna Tdap entre las semanas 27 y 36 de **cada embarazo** para proteger a su bebé contra la tosferina (pertussis). La tosferina es especialmente grave para los bebés recién nacidos y puede ser letal.
- **Vacuna contra el VSR:** Las personas embarazadas pueden recibir una sola dosis de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36 del embarazo durante los meses de septiembre a enero para proteger a su bebé recién nacido contra el VSR. El VSR produce bronquiolitis y neumonía en los niños pequeños y es la causa más común de hospitalización en los bebés recién nacidos.
- **Vacunas actualizadas contra la COVID-19 y la gripe (influenza):** Las vacunas actualizadas contra la COVID-19 y la gripe son seguras en todas las etapas del embarazo y pueden proteger a su bebé recién nacido contra la gripe y la neumonía hasta que tenga edad suficiente para recibir sus propias vacunas.
- **Vacuna contra la hepatitis B:** Las personas embarazadas que no han sido vacunadas contra la hepatitis B previamente deben hablar con su doctor acerca de recibir la vacuna contra la Hep B durante el embarazo.



Vacunas que necesitan los bebés al nacer

- **Vacuna contra la hepatitis B:** Su bebé recién nacido debe recibir la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas de su nacimiento para estar protegido contra la infección de la hepatitis B.
- **Inmunización de Nirsevimab (contra el virus VSR):** Si no ha recibido una vacuna contra el VSR durante el embarazo o su bebé nace dentro de los 14 días de haber recibido la vacuna contra el VSR, consulte a su pediatra sobre la aplicación de Nirsevimab a su bebé recién nacido antes o durante la temporada de VSR.

Si tiene preguntas, comuníquese con su doctor.

Para obtener más información, comuníquese con el Centro de Llamadas del Departamento de Salud Pública, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana, llamando al **1-833-540-0473**.

Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles: ph.lacounty.gov/vaccines

